

correcto diagnóstico e indicación precisa de la medicación, un conocimiento adecuado de los fármacos y de sus propiedades iatrogénicas. Existen medicamentos que contienen neurolépticos como antieméticos, antivertiginosos y sustancias de acción similar y de extendido uso como la flunarizina y la cinarizina.

El parkinsonismo farmacológico cede generalmente con la suspensión del neuroléptico o la asociación de anticolinérgicos. Las disquinesias tardías deben ser tratadas precozmente para evitar el riesgo de irreversibilidad y como medida terapéutica fundamental aconsejamos la desintoxicación a largo plazo.

PALABRAS CLAVE:

Parkinsonismo
Acatisia
Disquinesia
Neurolépticos
Prevención
Disquinesia buco-linguo-facial

siones la predominancia del tono varía en el tiempo de un grupo a otro dando disquinesias distónicas.

Los síndromes extrapiramidales farmacológicos pueden presentarse en forma precoz, a los pocos días del comienzo del tratamiento, lo que fue comparado por Delay y Deniker (2) al síndrome exitomotor descrito por Merie y Levy en 1920, en la encefalitis epidémica.

Estos síndromes precoces son en general del tipo disquinético-distónico, y suelen ser transitorios, aun no modificando la medicación (2)(1); se instalan dentro de los 4-5 primeros días en el 90% de los casos (1), principalmente con neurolépticos potentes del tipo

Dres. José Luis Caamaño (1), Ofrenda De Medina (2), Ruth Aijanati (3), Susana Romero (4), Noemí Lisanti (5), Víctor Plachin (6), Carlos Chouza (7).

1. Asistente de Patología Neurológica de la Escuela de Neurología Médica. 2. Asistente de Neurología. 3. Profesor Adjunto de Geriatria y Gerontología. 4. Ex-asistente de Neurología y de Neuropsicología. 5. Post-Grado de Neurología. 6. Post-Grado de Neurología. 7. Profesor Agregado de Neurología. **Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina. Universidad de la República.**

